

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### **Moderna et Pfizer : 2 vaccins au fonctionnement comparable et à l'efficacité identique**

*Alors que la campagne de rappel vaccinal contre la Covid-19 bat son plein, nombreux sont les Ligériens qui s'interrogent sur les similitudes et les différences entre les vaccins Moderna et Pfizer. Quel vaccin pour la dose de rappel ? Pourquoi Moderna n'est-il pas recommandé pour les personnes de moins de 30 ans ? L'ARS fait le point.*

#### **Pfizer et Moderna : quel vaccin pour la dose de rappel ?**

Les 2 vaccins Pfizer et Moderna sont équivalents. Ils ont le même principe actif (selon la technique dite de l'ARN messenger) et la même efficacité sur les formes grave de la maladie. Ils sont compatibles entre eux. Les seules différences concernent leur conditionnement et leurs modalités de conservation. On peut donc utiliser indifféremment l'un ou l'autre pour effectuer sa dose de rappel, quel que soit le vaccin initialement utilisé pour la vaccination.

#### **Pourquoi Moderna n'est-il pas recommandé pour les personnes de moins de 30 ans ?**

Des analyses menées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)<sup>1</sup> ont montré que, dans de très rares cas (132/1 000 000) les vaccins ARNm pouvaient créer chez les jeunes hommes, dans les sept jours suivant la vaccination, des myocardites et péricardites (inflammations passagères du muscle cardiaque qui n'occasionnent pas de décès). Chez les moins de 30 ans, les données montrent que ce phénomène est moins fréquent avec le vaccin Pfizer qu'avec le vaccin Moderna. Au-delà de 30 ans le risque, très faible, est le même avec les 2 types de vaccin. En France, la Haute autorité de santé (HAS) recommande donc de privilégier l'utilisation du vaccin Pfizer chez les personnes de moins de 30 ans, qu'il s'agisse d'une primo-vaccination ou d'un rappel vaccinal.

#### **Le vaccin Moderna provoque-t-il plus d'effets secondaires que le vaccin Pfizer ?**

Selon les données recueillies, alors que les deux vaccins à ARNm Pfizer et Moderna ont été utilisés pour des milliards d'injections dans le monde, nous savons que les deux sont extrêmement efficaces dans la prévention des formes graves et contre l'infection à la Covid-19, et présentent un très haut profil de sécurité. Les vaccins permettent de diviser par 12 le risque d'être hospitalisés en soins critiques, et par 10 le risque de décès, par rapport à une personne non vaccinée.

Les patients, y compris âgés de moins de 30 ans, ayant reçu une dose de Moderna par le passé n'ont aucune inquiétude à avoir. Comme le souligne la Haute Autorité de Santé et l'ANSM, les rares cas de myocardites ou de péricardites recensés sont survenus principalement dans les 7 jours suivant la vaccination, et n'ont à ce jour provoqué aucun décès. Malgré une vigilance partagée par tous les pays du monde utilisant ces 2 vaccins sur l'ensemble de leurs populations, aucun effet secondaire de moyen ou long terme n'a été identifié pour le vaccin Moderna comme pour le vaccin Pfizer.

## Peut-on faire sa dose de rappel en Moderna si l'on a reçu le vaccin Pfizer pour les deux premières injections (ou inversement) ?

Il n'y a aucune contre-indication médicale à recourir à une vaccination hétérologue, c'est-à-dire à faire son rappel avec un autre vaccin que celui avec lequel on a effectué son premier schéma vaccinal.

## L'immunité baisse-t-elle de la même façon après une vaccination en Pfizer et Moderna ?

L'immunité vaccinale contre le Covid-19 commence à diminuer au bout de cinq à six mois en général, quel que soit le vaccin utilisé lors du premier schéma vaccinal. Pour les personnes âgées ou immunodéprimées, ce délai est réduit à trois mois. C'est cette baisse de l'immunité qui explique la nécessité de faire une dose de rappel. Il est indispensable de bénéficier d'un « boost » immunitaire pour conserver une protection forte et durable contre le virus.



**COVID-19 :**  
**2 vaccins au fonctionnement comparable et à l'efficacité identique**

**Vaccins à ARN messenger**

**Aucune contre-indication à changer de vaccin entre 2 injections**  
Recommandation vaccinale de la HAS du 8 novembre 2021

**95% d'efficacité**  
Contre les formes graves, à partir de 14 jours pour une efficacité partielle et 7 jours pour une protection maximale

**Des questions?**  
Parlez-en à un professionnel de santé ou rendez-vous sur le site [www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr](http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr)

© Agence Régionale de Santé Pays de la Loire - Document 2021

Pensé pour permettre un usage simple et rapide auprès des professionnels mobilisés, ce document est téléchargeable et facilement imprimable depuis [le site internet de l'ARS Pays de la Loire](http://le site internet de l'ARS Pays de la Loire).

Pour aller plus loin : [Recommandation vaccinale de la HAS du 8 novembre 2021](http://Recommandation vaccinale de la HAS du 8 novembre 2021)

**Contact presse**  
**Direction générale**  
**Département communication**  
[ars-pdl-communication@ars.sante.fr](mailto:ars-pdl-communication@ars.sante.fr)  
**06 78 26 56 94**